

Dienogeste

O que diferencia o dienogeste de outros progestágenos e quais são os benefícios para as usuárias de QLAIRA®?

Índice uterotrópico

A potência do dienogeste no endométrio é 4x maior que a de qualquer outra progestina sintética.¹




Gráfico adaptado da referência 1.




Inibição efetiva da ovulação, com ação moderada na hipófise²

Bloqueio parcial das gonadotrofinas: produção residual de estrogênio e testosterona pelos ovários²

Manutenção das funções estrogênio-dependentes:^{2,3,4}

- Trofismo vaginal
- Vigília
- Humor
- Funções cognitivas



Forte ação local no endométrio¹

- Bom controle de ciclo⁵
- Reduz substancialmente a inflamação e sangramento menstrual^{2,5}
- Redução da dismenorria⁶

Qlaira®

valerato de estradiol
dienogeste



Se é Bayer, é bom

UMA ESCOLHA, DIVERSAS RAZÕES^{7,12}

- ▶ 80,2% de continuidade e satisfação em mulheres jovens.⁷
- ▶ MENOR TAXA DE FALHA contraceptiva em vida real.^{8*}
- ▶ MENOS SINTOMAS associados ao ILH.^{9,10**}
- ▶ BAIXO IMPACTO metabólico.¹¹
- ▶ Risco de TEV similar ou até MENOR.^{12*}

*EM COMPARAÇÃO A OUTROS COCS CONTENDO LEVONORGESTREL OU OUTRAS PROGESTERONAS.
** EM COMPARAÇÃO A OUTROS COCS CONTENDO LEVONORGESTREL E NORGESTIMATO.

QLAIRA® - VALERATO DE ESTRADIOL/DIENOGESTE. REG. MS -1.7056.0049. INDICAÇÕES: CONTRACEPTIVO ORAL. **CONTRA-INDICAÇÕES:** DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE GRAVIDEZ, LACTAÇÃO, PROCESSOS TROMBOEMBÓLICOS ARTERIAIS OU VENOSOS, SINTOMAS E/OU SINAIS PRODRÔMICOS DE TROMBOSE; ENXAQUECA COM SINTOMAS NEUROLÓGICOS FOCAIS; DIABETES MELLITUS COM ALTERAÇÕES VASCULARES; PRESENÇA DE UM FATOR DE RISCO GRAVE OU MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO PARA A TROMBOSE ARTERIAL OU VENOSA, PANCREATITE ASSOCIADA À HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE; DOENÇA HEPÁTICA GRAVE, TUMORES HEPÁTICOS; NEOPLASIAS INFLUENCIADAS POR ESTERÓIDES SEXUAIS; SANGRAMENTO VAGINAL NÃO-DIAGNOSTICADO; HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DO PRODUTO. **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** O RISCO DE PROCESSOS TROMBOEMBÓLICOS ARTERIAIS OU VENOSOS OU DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, AUMENTA COM IDADE; HISTÓRIA FAMILIAR POSITIVA; OBESIDADE; DISLIPOPROTEINEMIA; HIPERTENSÃO; ENXAQUECA; VALVULOPATIA; FIBRILAÇÃO ATRIAL; IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA, CIRURGIA DE GRANDE PORTE, QUALQUER INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM MEMBROS INFERIORES OU TRAUMA EXTENSO. OUTRAS CONDIÇÕES: DIABETES MELLITUS, LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA, PATOLOGIA INTESTINAL INFLAMATÓRIA CRÔNICA E ANEMIA FALCIFORME. HIPERTRIGLICERIDEMIA, OU HISTÓRIA FAMILIAR DA MESMA, O USO DE COCS POR PERÍODO PROLONGADO PODE CONTRIBUIR PARA AUMENTO DO RISCO DE CÂNCER CERVICAL, DE MAMA, ICTERICIA E/OU PRURIDO RELACIONADOS À COLESTASE; FORMAÇÃO DE CÁLCULOS BILIARES; PORFÍRIA; LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO; SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA; COREIA DE SYDENHAM; HERPES GESTACIONAL; PERDA DA AUDIÇÃO RELACIONADA COM A OTOSCLEROSE, ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** FENITOÍNA, BARBITÚRICOS, PRIMIDONA, CARBAMAZEPINA, RIFAMPICINA E TAMBÉM POSSIVELMENTE COM OXCARBAZEPINA, TOPIRAMATO, FELBAMATO, GRISEOFULVINA E PRODUTOS CONTENDO ERVA DE SÃO JOÃO, INIBIDORES DA HIV/HCV PROTEASE E INIBIDORES NÃO NUCLEOSÍDEOS DA TRANSCRIPTASE REVERSA. CERTOS ANTIBIÓTICOS, COMO AS PENICILINAS E TETRACICLINAS, ANTIFÚNGICOS AZÓLICOS, CIMETIDINA, VERAPAMIL, MACROLÍDEOS, DILTIAZEM, ANTIDEPRESSIVOS E SUÇO DE TORONJA (GRAPEFRUIT), LAMOTRIGINA. **EVENTOS ADVERSOS:** DEPRESSÃO/HUMOR DEPRIMIDO, LABILIDADE EMOCIONAL, DIMINUIÇÃO DA LIBIDO, ENXAQUECA, NÁUSEAS, DOR NAS MAMAS, SANGRAMENTO UTERINO INESPERADO, EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS. **POSOLOGIA:** INGERIR UM COMPRIMIDO POR DIA DURANTE 28 DIAS CONSECUTIVOS. CADA CARTELA SUBSEQUENTE É INICIADA NO DIA SEGUINTE À INGESTÃO DO ÚLTIMO COMPRIMIDO DA CARTELA ANTERIOR, SEM PAUSA ENTRE ELAS. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE A BULA COMPLETA DO PRODUTO. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 0800 702 1241. (QLA 2017-01-06-119)**

CONTRAINDICAÇÃO: TROMBOEMBOLISMO VENOSO OU ARTERIAL. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: INDUTORES DE ENZIMAS MICROSSOMAS HEPÁTICAS.

REFERÊNCIAS: • 1. MUECKA O. THE IDEAL PROGESTEGEN FOR COMBINATION WITH ESTRADIOL. GYNECOL FORUM. 2009;14(2):5-8. • 2. OETTEL M, BREITBARTH H, ELGER W, ET AL. THE PHARMACOLOGICAL PROFILE OF DIENOGEST. EUR J CONTRACEP REPROD HEALTH CARE. 1999;4(1):2-13. • 3. ZEJN S, LIU M, UDDIN A, ET AL. PHARMACOKINETICS OF AN ORAL CONTRACEPTIVE CONTAINING OESTRADIOL VALERATE AND DIENOGEST. EUR J CONTRACEP REPROD HEALTH CARE. 2009;14(3):221-232. • 4. MUECKA A, SEEGER H, BÜHLING KJ. WHY USE DIENOGEST FOR THE FIRST CONTRACEPTIVE PILL WITH ESTRADIOL? GYNECOL ENDOCRINOL. 2010; 26(2):109-113. • 5. NELSON A, PARKE S, MAKALOVA D, ET AL. EFFICACY AND BLEEDING PROFILE OF A COMBINED ORAL CONTRACEPTIVE CONTAINING OESTRADIOL VALERATE/ DIENOGEST: A POOLED ANALYSIS OF THREE STUDIES CONDUCTED IN NORTH AMERICA AND EUROPE. EUR J CONTRACEP REPROD HEALTH CARE. 2013;18:264-273. • 6. PETRAGLIA F, PARKE S, SERRANI M, ET AL. ESTRADIOL VALERATE PLUS DIENOGEST VERSUS ETHINYLESTRADIOL PLUS LEVONORGESTREL FOR THE TREATMENT OF PRIMARY DYSMENORRHEA. INT J GYNECOL OBSTET. 2014;125: 270-274. • 7. BRIGGS P, SERRANI M, ET AL. CONTINUATION RATES, BLEEDING PROFILE ACCEPTABILITY, AND SATISFACTION OF WOMEN USING AN ORAL CONTRACEPTIVE PILL CONTAINING ESTRADIOL VALERATE AND DIENOGEST VERSUS A PROGESTOGEN-ONLY PILL AFTER SWITCHING FROM AN ETHINYLESTRADIOL-CONTAINING PILL IN A REAL-LIFE SETTING: RESULTS OF THE CONTENT STUDY. CLINICAL TRIAL REPORT. 2016;8:477-487. • 8. BARNETT C, HAGEMANN C, DINGER J, ET AL. FERTILITY AND COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES – UNINTENDED PREGNANCIES AND PLANNED PREGNANCIES FOLLOWING ORAL CONTRACEPTIVE USE – RESULTS FROM THE INAS-SCORE STUDY. EUR J CONTRACEP REPROD HEALTH CARE. 2016;1-7. • 9. MACIAS G, MERKI-FELD GS, PARKE S, ET AL. EFFECTS OF A COMBINED ORAL CONTRACEPTIVE CONTAINING ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST ON HORMONE WITHDRAWAL ASSOCIATED SYMPTOMS: RESULTS FROM THE MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE-CONTROLLED, HARMONY II STUDY. J OBSTET GYNECOL. 2013; 33:591-596. • 10. JENSEN JT, PARKE S, MELLINGER U, ET AL. HORMONE WITHDRAWAL-ASSOCIATED SYMPTOMS: COMPARISON OF ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST VERSUS ETHINYLESTRADIOL/NORGESTIMATE. OBSTET GYNECOL. 2013;18:274-283. • 11. JUNGE W, MELLINGER U, PARKE S, SERRANI M. METABOLIC AND HAEMOSTATIC EFFECTS OF ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST, A NOVEL ORAL CONTRACEPTIVE. A RANDOMISED, OPEN-LABEL, SINGLE-CENTER STUDY. CLIN DRUG INVESTIG. 2011;31(8):573-584. • 12. DINGER J, DO MINHT, HEIEMANN K. IMPACT OF ESTROGEN TYPE ON CARDIOVASCULAR SAFETY OF COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES. CONTRACEPTION. 2016;94:328-339.

SAC 0800 7021241
sac@bayer.com
Respeito por você

ESTA MENSAGEM É DESTINADA SOMENTE A PROFISSIONAIS DA SAÚDE HABILITADOS A PRESCREVER E
DISPENSAR MEDICAMENTOS.
PP-QLA-BRA-0005-1

www.Qlaira.com.br