

Sua paciente está preocupada com o impacto da pílula nos níveis de testosterona?



O aumento nos níveis de SHBG diminui os níveis de testosterona circulante ou livre¹

Aumento médio intraindividual de SHBG²

Aumento % a partir do Basal após 7 ciclos

Qlaira®
EE/LNG

62,7%

111,6%

Gráfico adaptado de Ref.2

Qlaira®

Menor diminuição* nos níveis de DHEA, testosterona total e livre¹

Baixa atividade antigonadotrófica³

Menor impacto nos níveis de SHBG em comparação a combinação EE/LNG.²

*quando comparado a EE/LNG

REFERÊNCIAS: 1. DAVIS SR, BITZER JJ, GIRALDI A ET AL. CHANGE TO EITHER NONANDROGENIC OR ANDROGENIC PROGESTIN-CONTAINING ORAL CONTRACEPTIVE PREPARATION IS ASSOCIATED WITH IMPROVED SEXUAL FUNCTION IN WOMEN WITH ORAL CONTRACEPTIVE-ASSOCIATED SEXUAL DYSFUNCTION. J SEX MED 2013;10(12):3069-79 2. JUNGE W, MELLINGER U, PARKE S, SERRANI M. METABOLIC AND HAEMOSTATIC EFFECTS OF ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST, A NOVEL ORAL CONTRACEPTIVE. A RANDOMISED, OPEN-LABEL, SINGLE-CENTER STUDY. CLIN DRUG INVESTUG. 2011;31(8):573-584 1999;4(SUPPL 1):2-13. 3. OETTEL M, BREITBARTH H, ELGER W, ET AL. THE PHARMACOLOGICAL PROFILE OF DIENOGEST. EUR J CONTRACEP REPROD HEALTH CARE.

Uma escolha, diversas razões¹⁻⁶

Qlaira®

Menor risco
de TEV em
comparação com
outros COCs²

Redução das
dores de cabeça
e pélvicas
associadas
ao ILH⁴

Mais de 80%
de satisfação em
pacientes jovens³

Taxa de falha
contraceptiva
menor que a da
combinação EE/LNG
em pacientes
<25 anos¹



TEV: TROMBOEMBOLISMO VENOSO | TEA: TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL | COCS: CONTRACEPTIVOS ORAIS COMBINADOS | ILH: INTERVALO LIVRE DE HORMÔNIOS

QLAIRA® - VALERATO DE ESTRADIOL/DIENOGESTE. REG. MS - 1.7056.0049. INDICAÇÕES: CONTRACEPTIVO ORAL. **CONTRA-INDICAÇÕES:** DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE GRAVIDEZ, LACTAÇÃO, PROCESSOS TROMBOEMBÓLICOS ARTERIAIS OU VENOSOS, SINTOMAS E/OU SINAIS PRODRÔMICOS DE TROMBOSE; ENXAQUECA COM SINTOMAS NEUROLÓGICOS FOCAIS; DIABETES MELLITUS COM ALTERAÇÕES VASCULARES; PRESENÇA DE UM FATOR DE RISCO GRAVE OU MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO PARA A TROMBOSE ARTERIAL OU VENOSA; PANCREATITE ASSOCIADA A HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE; DOENÇA HEPÁTICA GRAVE; TUMORES HEPÁTICOS; NEOPLASIAS INFLUENCIADAS POR ESTEROIDES SEXUAIS; SANGRAMENTO VAGINAL NÃO-DIAGNOSTICADO; HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DO PRODUTO. **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** O RISCO DE PROCESSOS TROMBOEMBÓLICOS ARTERIAIS OU VENOSOS OU DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, AUMENTA COM IDADE; HISTÓRIA FAMILIAR POSITIVA; OBESIDADE; DISLIPOPROTEINEMIA; HIPERTENSÃO; ENXAQUECA; VALVULOPATIA; FIBRILAÇÃO ATRIAL; IMOBILIZAÇÃO PROLONGADA; CIRURGIA DE GRANDE PORTE, QUALQUER INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM MEMBROS INFERIORES OU TRAUMA EXTENSO. OUTRAS CONDIÇÕES: DIABETES MELLITUS, LÚPUS ERMATOSO SISTÊMICO, SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA, PATOLOGIA INTESTINAL INFLAMATÓRIA CRÔNICA E ANEMIA FALCOIFORME. HIPERTRIGLICERIDEMIA OU HISTÓRIA FAMILIAR DA MESMA. O USO DE COCS POR PERÍODO PROLONGADO, PODE CONTRIBUIR PARA AUMENTO DO RISCO DE CÂNCER CERVICAL, DE MAMA, ICTERICIA E/OU PRURIDO RELACIONADOS A COLESTASE; FORMAÇÃO DE CÁLCULOS BILIARES; PORFÍRIA; LÚPUS ERMATOSO SISTÊMICO; SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA; COREIA DE SYDENHAM; HERPES GESTACIONAL; PERDA DA AUDIÇÃO RELACIONADA COM A OTOSCLEROSE; ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** FENITOÍNA, BARBITÚRICOS, PRIMIDONA, CARBAMAZEPINA, RIFAMPICINA E TAMBÉM POSSIVELMENTE COM OXCARBAZEPINA, TOPIRAMATO, FELBAMATO, GRISEOFULVINA E PRODUTOS CONTENDO ERVA DE SÃO JOÃO. INIBIDORES DA HIV/HCV PROTEASE E INIBIDORES NÃO NUCLEOSÍDEOS DA TRANSCRIPTAASE REVERSA. CERTOS ANTIBIÓTICOS, COMO AS PENICILINAS E TETRACICLINAS, ANTI-FÚNGICOS AZÓLICOS, CIMETIDINA, VERAPAMIL, MACROLÍDEOS, DILTIAZEM, ANTIDEPRESSIVOS E SUCO DE TORONJA (GRAPEFRUIT), LAMOTRIGINA. **EVENTOS ADVERSOS:** DEPRESSÃO/HUMOR DEPRIMIDO, LABILIDADE EMOCIONAL, DIMINUIÇÃO DA LIBIDO, ENXAQUECA, NAUSEAS, DOR NAS MAMAS, SANGRAMENTO UTERINO INESPERADO, EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS. **POSOLOGIA:** INGERIR UM COMPRIMIDO POR DIA DURANTE 28 DIAS CONSECUTIVOS. CADA CARTELA SUBSEQUENTE É INICIADA NO DIA SEGUINTE À INGESTÃO DO ÚLTIMO COMPRIMIDO DA CARTELA ANTERIOR, SEM PAUSA ENTRE ELAS. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE A BULA COMPLETA DO PRODUTO. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 0800 702 1241. (QLA 2017-01-06-119)**

CONTRAINDICAÇÃO: TROMBOEMBOLISMO VENOSO OU ARTERIAL.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: INDUTORES DE ENZIMAS MICROSSOMAS HEPÁTICAS.

REFERÊNCIAS: 1. (2018) BOOK OF ABSTRACTS: THE 15TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH, THE EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION & REPRODUCTIVE HEALTH CARE. 23.SUP1, A-081; 85. DOI: 10.1080/13625187.2018.1442911. 2. (2018) BOOK OF ABSTRACTS: THE 15TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH, THE EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION & REPRODUCTIVE HEALTH CARE. 23.SUP1, FC-0340. DOI: 10.1080/13625187.2018.1442911. 3. BRIGGS P, SERRANI M, VOGTLÄNDER K, PARKE S. CONTINUATION RATES, BLEEDING PROFILE ACCEPTABILITY, AND SATISFACTION OF WOMEN USING AN ORAL CONTRACEPTIVE PILL CONTAINING ESTRADIOL VALERATE AND DIENOGEST VERSUS A PROGESTOGEN-ONLY PILL AFTER SWITCHING FROM AN ETHINYL-ESTRADIOL-CONTAINING PILL IN A REAL-LIFE SETTING: RESULTS OF THE CONTENT STUDY. INT J WOMENS HEALTH. 2016 SEP 15;8:477-487. 4. MACIAS G, MERKI-FELD GS, PARKE S, ET AL. EFFECTS OF A COMBINED ORAL CONTRACEPTIVE CONTAINING ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST ON HORMONE WITHDRAWAL-ASSOCIATED SYMPTOMS: RESULTS FROM THE MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE-CONTROLLED, HARMONY II STUDY. J OBSTET GYNECOL. 2013; 33:591-596.

Material para uso do representante da Bayer S.A. para promoção exclusiva a profissionais da saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.

PP-QLA-BRA-0089-1 AGO/2019



Se é Bayer, é bom

SAC 0800 7021241
sac@bayer.com
Respeito por você

Qlaira®

valerato de estradiol
dienogeste